2023-4546
2023-08-28

(Unit Label)
GREEN WAY ANT & ROACH BAIT GEL

Insecticide

RTU or Refill (optional)
Ant and Roach Illustration (Optional)

No Mess – No Ants
Use Indoors or Out

Honeydew Formula

COMMERCIAL

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

GUARANTEE: Disodium Octaborate Tetrahydrate 6.0%

REGISTRATION NO. 30375 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS:

42g syringe

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

(Package Label) GREEN WAY
ANT & ROACH BAIT GEL

Insecticide

RTU or Refill (optional)
Ant and/or Roach Illustration (Optional)

No Mess – No Ants
Use Indoors or Out

Honeydew Formula

COMMERCIAL

READ THE LABEL BEFORE USING
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

GUARANTEE: Disodium Octaborate Tetrahydrate 6.0%

REGISTRATION NO. 30375 PEST CONTROL PRODUCTS ACT

NET CONTENTS:

42 g syringe [1to 6 syringes per box]

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

GREEN WAY
ANT & ROACH BAIT GEL

GREEN WAY ANT & ROACH BAIT GEL incorporates boron (in the form of disodium octaborate tetrahydrate) in a special food bait which is highly attractive to ants, carpenter ants and cockroaches. Ants and carpenter ants pick up the bait and take it to their nests to feed the colony. Cockroaches will feed directly on the bait and die, but will not share the bait. The boron works slowly and sufficient bait should be made available for at least 14 days of continuous feeding. The ants and carpenter ants will return to their nests after consuming the bait and will feed their young and the queen, destroying the colony. Repeat placement of the bait until satisfactory control has been achieved.

Do not use sprays, foggers or any chemicals or cleaners near the bait containers or placements. This may contaminate the bait and cause the insects to cease feeding.

For control of ants, carpenter ants and cockroaches, use indoors or outdoors near homes, apartments, condominiums, schools, hospitals, restaurants, grocery stores, food processing plants, boats, cruise ships, institutional and commercial buildings, nursing homes, hotels and warehouses.

DIRECTIONS FOR USE:

GREEN WAY ANT & ROACH BAIT GEL is applied with the syringe. Remove a syringe from the package and inject gel into cracks and crevices around windows and doors, inside and out, along baseboards, in dead spaces or any other tight space where the bait is protected from exposure and inaccessible to children and pets.

GREEN WAY ANT & ROACH BAIT GEL syringe may be used to inject the gel into devices that provide entry to ants, carpenter ants and cockroaches, but protect the bait from exposure to humans, domestic animals and the elements. The bait can dispensed in bait stations, or can be used to refill ant and cockroach bait stations sold with the bait or in ant and cockroach bait stations designed for the addition of bait (i.e. Ant Café, or other similar bait stations) (optional.)

(Illustration – optional)

GREEN WAY ANT & ROACH BAIT GEL

Indoors: Place bait stations 1.5-3.0 metres apart where ants, carpenter ants or cockroaches are numerous. Replace bait stations as needed. Place stations under food cabinets, sinks, stoves, refrigerators, food storage areas, attics, garages, basements, storage areas and closets. Place on exterior windowsills and in doorways to help prevent entry of ants, carpenter ants or cockroaches. Some bait stations may be designed to be affixed to a wall or placed on a flat surface. When using bait stations, wash hands thoroughly before handling to remove any odours that may be repellent to ants, carpenter ants or cockroaches, i.e. tobacco, garlic, chemicals/ cleaners.

Outdoors: Place bait stations near where ants enter dwellings. For best results place stations in shaded areas or create shade for the bait station. [Avoid placing bait station where it will receive direct sunlight whenever possible.](Optional)

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN AND DOMESTIC ANIMALS. Avoid contamination of water, foodstuffs and utensils. Wash hands after use. Wear long-sleeved shirt and long pants when applying the product

FIRST AID:
IF SWALLOWED: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF ON SKIN/CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.
IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth, if possible.

Take the container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

DISPOSAL:
1. Thoroughly rinse the empty container. Spread rinsings on soil surface around anthills.
2. Follow provincial instruction for any required additional cleaning of the container prior to its disposal.
3. Make the empty container unsuitable for further use.
4. Dispose of the container in accordance with provincial requirements.
5. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label. The user assumes the risk to persons or property that arises from any such use of this product.

2023-4546
2023-08-28

(Étiquette du distributeur d'appâts)
GREEN WAY
APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES

Insecticide

Prêt à utiliser ou rechange (facultatif)
Image d'une fourmi et d'une blatte (facultatif)

Sans dégât – Pas de fourmis
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Formule melon miel

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Octaborate de disodium tétrahydrate 6,0 %

Nº D'HOMOLOGATION 30375 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET : Seringue de 42g

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

(Étiquette de l'emballage)
GREEN WAY
APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES

Insecticide

Prêt à utiliser ou rechange (facultatif)
Image d'une fourmi, d'une blatte ou des deux (facultatif)

Sans dégât – Pas de fourmis
Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur

Formule melon miel

COMMERCIAL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARANTIE : Octaborate de disodium tétrahydrate 6,0 %

N° D'HOMOLOGATION 30375 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET :

Seringue de 42 g [1 à 6 seringues par boîte]

Innovative Pest Control Products
5745 SW 75th Street #191
Gainesville, FL 32608
1 561-350-9998

GREEN WAY
APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES

GREEN WAY APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES incorpore du bore (sous forme d'octaborate de disodium tétrahydrate) à un appât alimentaire spécial très appétissant pour les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes. Les fourmis et les fourmis charpentières ramassent l'appât puis le ramènent au nid pour nourrir la colonie. Les blattes mangent l'appât immédiatement et meurent, mais elles ne partagent pas l'appât. Le bore agit lentement, et on devrait prévoir suffisamment d'appât pour assurer une alimentation continue pendant au moins 14 jours. Après avoir consommé l'appât, les fourmis et les fourmis charpentières retournent au nid puis nourrissent les portées et la reine, détruisant ainsi la colonie. Continuer de placer l'appât jusqu'à ce que l'on obtienne une suppression satisfaisante.

Ne pas utiliser de pulvérisateur, de nébulisateur ni d'aucun produit chimique ou nettoyant près des contenants d'appâts ou des endroits où ils ont été placés. Cela risquerait de contaminer l'appât, et les insectes cesseraient donc de s'en nourrir.

Pour supprimer les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes, utiliser le produit à l'intérieur ou à l'extérieur près des habitations, appartements, condominiums, écoles, hôpitaux, restaurants, épiceries, usines de transformation des produits alimentaires, bateaux, paquebots de croisière, immeubles commerciaux ou institutionels, maisons de soins infirmiers, hôtels et entrepôts.

MODE D'EMPLOI :

GREEN WAY APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES s'applique au moyen de la seringue. Sortir une seringue de l'emballage et injecter le gel dans les fentes et fissures autour des fenêtres et portes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Utiliser le produit le long des plinthes, des vides de murs et tout autre espace serré où l'appât est protégé des éléments et inaccessible aux enfants et aux animaux de compagnie.

La seringue GREEN WAY APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES peut aussi servir à injecter le gel dans des appareils qui permettent aux fourmis, aux fourmis charpentières et aux blattes d'entrer, mais qui cachent l'appât des humains, des animaux domestiques et des éléments. L'appât peut servir à remplir les distributeurs d'appât vendus avec l'appât ou les distributeurs d'appât pour fourmis, fourmis charpentières et blattes conçus pour l'ajout d'appât (c'est-à-dire Ant Café ou autre distributeur d'appât semblable). (facultatif)

(Illustration – facultatif)

GREEN WAY APPÂT EN GEL POUR FOURMIS ET BLATTES
À l'intérieur : Placer les distributeurs d'appât à une distance de 1,5 à 3,0 mètres les uns des autres là où les fourmis, les fourmis charpentières et les blattes sont nombreuses. Remplacer les distributeurs d'appât au besoin. Placer les distributeurs d'appât sous les armoires à aliments, éviers, cuisinières, réfrigérateurs, aires d'entreposage des aliments, greniers, garages, sous-sols, aires d'entreposage et garde-robes. Pour empêcher les fourmis, les fourmis charpentières et les

blattes d'entrer dans l'habitation, placer le distributeur d'appât sur l'extérieur des appuis de fenêtre et dans les entrées de porte. Certains distributeurs d'appât sont conçus pour être fixés à un mur ou placés sur une surface plane. Lorsqu'on utilise un distributeur d'appât, se laver les mains à fond avant de le manipuler afin d'éliminer toute odeur qui pourrait repousser les fourmis, p. ex., tabac, ail, produits chimiques/nettoyants.

À l'extérieur : Placer les distributeurs d'appât près des endroits où les fourmis pénètrent dans les habitations. Pour obtenir les meilleurs résultats, créer de l'ombrage pour le distributeur d'appât ou les placer dans des endroits ombragés. [Chaque fois qu'il est possible, éviter de placer le distributeur d'appât dans un endroit en plein soleil.] (facultatif)

MISES EN GARDE : TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES. Éviter de contaminer l'eau, les produits alimentaires et les ustensiles. Se laver les mains après l'utilisation. Porter une chemise à manches longues et un pantalon long lors de l'utilisation.
PREMIERS SOINS :
EN CAS D'INGESTION : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Apporter l'étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsque vous consultez un médecin.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptômes.

ÉLIMINATION :

1. Rincer à fond le contenant vide. Verser les rinçures sur la surface du sol autour des nidsde fourmis.

2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
3. Rendre le contenant vide inutilisable.
4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.